



En el tramo urbano del río Guadiana en Mérida

Mortandad de peces debido a un problema temporal de eutrofia.

- La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha puesto en marcha un dispositivo de recogida para evitar acumulaciones y malos olores en el tramo afectado.

09.sep.08 La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha detectado la aparición puntual de peces muertos en la zona comprendida en el tramo urbano de río Guadiana de Mérida.

Aunque las cantidades aparecidas no son alarmantes existe un dispositivo de recogida para evitar acumulaciones y malos olores en el tramo afectado. Los ejemplares retirados son en su mayoría barbos de gran tamaño de los que hasta el momento se llevan recogidos más de 6.000 KI.

Así mismo y una vez efectuadas las correspondientes analíticas de agua y de toxicología de dichos ejemplares, se ha podido comprobar que esta mortandad se debe a un problema temporal de eutrofia, derivado fundamentalmente del exceso de fitoplancton (microflora acuática) presente en el agua.

Puesto que no se han encontrado elementos tóxicos de posibles vertidos (pesticidas, industrias, etc) ni tampoco indicios de enfermedades u otros patógenos asociados a esta especie, es previsible que en breve este problema de mortandad cese.

El origen de este proceso de eutrofización se debe fundamentalmente al exceso de nutrientes procedentes del retorno de regadío y a las condiciones climáticas; afectando a la zona de cola del embalse de Montijo, que coincide básicamente con el tramo urbano de Mérida.

En todo momento se ha estado en contacto con la administración autonómica y local para prever cualquier tipo de incidencias.