

MAYO Y JUNIO
2026

Censos y análisis poblacional en embalses

*Poblaciones Estivales en los embalses de los
Canchales, Búrdalo, Alcollarín, Gargáligas,
Gasset, Azudes de Orellana y el Vicario*



ÍNDICE

1. Introducción.....	2
2. Metodología	2
3. Resultados de los muestreos realizados	4
Embalse de los Canchales	4
Embalse de Alcollarín	8
Embalse del Vicario	10
Embalse del Búrdalo.....	13
Embalse del Gasset	16
Azudes de Orellana	19
Embalse de Gargáligas	21
4. Tendencias poblacionales anuales	24
Embalse de Canchales	24
Embalse de Alcollarín	25
Embalse de El Vicario	27
Embalse del Búrdalo.....	28
5. Conclusiones	29
Embalse de los Canchales	29
Embalse de Alcollarín	30
Embalse del Vicario	30
Embalse del Búrdalo.....	31
Embalse de Gasset	31
Azudes de Orellana	31
Embalse de Gargáligas	32

1. Introducción

La Confederación Hidrográfica del Guadiana viene realizando censos de aves acuáticas en distintos embalses de la cuenca desde 2005. Su objetivo es estudiar la evolución de estas poblaciones y constatar la efectividad de las actuaciones medioambientales que se han venido desarrollando.

La relevancia de estos censos radica en la información aportada por las especies censadas en las zonas de estudio y en poder tener un conocimiento de la evolución de las poblaciones en un amplio periodo de tiempo, así como del efecto que las distintas actuaciones medio-ambientales han podido ejercer sobre ellas. El análisis de esta información proporciona la identificación de especies de aves con un status de protección legal, lo cual incrementa el valor de los embalses censados como zonas de importancia e interés para la conservación de estas especies. Además, en algunos casos estas especies llevan asociados manuales de conservación o planes de manejo.

Asimismo, la frecuencia con la cual son observadas las aves según el periodo de censo estacional, permite establecer el estatus de las especies en los embalses, diferenciando entre residentes, invernales y estivales. A nivel estructural de población y comunidad, el estudio facilita el análisis de la evolución de las poblaciones y su composición como comunidad, aportando nociones que podrían ayudar a la conservación de estas comunidades a medio y largo plazo.

Este informe tiene por objeto mostrar los resultados de los censos de aves acuáticas estivales llevados a cabo en los embalses de Canchales, Búrdalo, Alcollarín, Gargáligas, Gasset, los azudes de Orellana Búrdalo y Vicario durante el periodo de estiaje de mayo y junio de 2026.

2. Metodología

Por norma general, las fechas de los censos internacionales vienen determinadas por la organización no gubernamental *Wetlands International*, dedicada a la organización de especies y restauración de humedales, por lo que se intenta seguir esta metodología a la hora de realizar los trabajos de muestreo.

Los censos son realizados en una sola jornada, siempre llevados a cabo al menos por un observador o técnico experimentado y asistido, tanto en la observación como en la toma de datos, por un técnico acompañante. Con esta doble observación se pretende reforzar la objetividad de los datos recogidos. En masas de agua donde la población es muy abundante se puede llegar a doblar en número de muestreadores para agilizar el conteo y evitar la duplicidad en la toma de datos como consecuencia del desplazamiento de individuos de unas zonas a otras de la masa de agua.

Los conteos se realizan por la mañana, evitando la primera luz del día para asegurar la entrada de aves que se alimentan de noche fuera de los embalses como el caso del Ánade azulón (*Anas platyrhynchos*). Por el contrario, puede resultar que otras especies hayan abandonado

dormideros a horas muy tempranas, lo que podría minusvalorar la presencia de estas especies, como por ejemplo el Cormorán Grande (*Phalacrocorax carbo*).

Los conteos se realizan mediante un recorrido perimetral por las orillas de los embalses, estableciendo puntos de observación fijos y otros alternativos donde la visibilidad de los puntos de observación no se vea reducida por la vegetación existente o por la luz directa del sol. Una vez avistadas las aves, se realiza la identificación y posterior conteo individual, si el número de ejemplares observados lo permite. Si el número de ejemplares avistados sea lo suficientemente grande como para no poder precisar individualmente cada ejemplar, primero se lleva a cabo la identificación de las especies presentes y seguidamente se utiliza la misma técnica de “aforo” que en los censos aéreos. En este caso, se extremen las precauciones debido a una tendencia a la sobreestimación en el número de bandos formados por unos pocos cientos de aves (*Prater*, 1979).

Durante estos muestreos se pretenden censar todas las aves no paseriformes ligadas a los humedales, debido a que el objetivo es valorar la capacidad de acogida que tienen nuestros embalses. Los censos de aves acuáticas se han convertido en un instrumento fundamental para el conocimiento y valoración de sus hábitats, los humedales, que son objeto de atención preferente por su fragilidad y singularidad.

El material óptico utilizado es el siguiente:

- Telescopios: KOWA TSN-821/oculares KOWA zoom 20x60.
- Trípodes de telescopio: Kit trípodes MONFROTTO FR 8X30.
- Prismáticos: VANGUARD FR 8X30, VORTEX DiamondBack

En mayo y junio de 2026 se han realizado los censos de aves acuáticas estivales en los embalses de los **Canchales, Gasset, Búrdalo, Alcollarín, Gargáligas, Azudes de Orellana y Vicario**. Además del conteo de las especies observadas, se registra la abundancia, la fecha y el horario del censo.

A continuación, se adjuntan las tablas y los gráficos con los datos obtenidos por embalse. Para la realización de los gráficos de abundancia por familias se ha utilizado la siguiente clasificación:

- **Somormujos y Zampullines:** Somormujo Lavanco, Zampullín Chico y Zampullín Cuellinegro.
- **Cormoranes:** Cormorán Grande.
- **Garzas, Cigüeñas e Íbises:** Avetorillo, Cigüeña Blanca, Cigüeña Negra, Espátula, Garceta Común, Garceta Grande, Garcilla Bueyera, Garcilla Cangrejera, Garza Imperial, Garza Real, Martinete y Morito.
- **Ánades:** Ánade Friso, Ánade Rabudo, Ánade Real, Ánade Silbón, Ánsar Común, Cercera Carretona, Cerceta Común, Cerceta Pardilla, Malvasía Cabeciblanca, Pato Colorado, Pato Cuchara, Porrón Común, Porrón Moñudo, Porrón Pardo y Tarro Blanco.
- **Rapaces diurnas:** Águila Pescadora, Aguilucho Lagunero y Aguilucho Pálido.
- **Rascones, Gallinetas y Fochas:** Calamón Común, Focha Común, Polla de Agua y Rascón.
- **Grullas:** Grulla Común.

- **Limícolas:** Agachadiza Chica, Agachadiza Común, Aguja Colinegra, Alcaraván, Andarríos Chico, Andarríos Grande, Archibebe Claro, Archibebe Común, Archibebe Oscuro, Avefría, Avoceta, Canastera, Chorlitejo Chico, Chorlitejo Grande, Chorlitejo Patinegro, Chorlito Dorado, Chorlito Gris, Cigüeñuela, Combatiente, Correlimos Común, Correlimos Menudo, Correlimos Zarapatin, y Zarapito Real.
- **Charranes:** Charrancito, Fumarel Cariblanco, Fumarel Común, Pagaza Piconegra.
- **Gaviotas:** Gaviota Patiamarilla, Gaviota reidora y Gaviota Sombría.

Las intensas lluvias de diciembre y enero favorecieron la crecida de nivel de muchos embalses y masas de agua en Extremadura y Castilla desde verano de 2024, **dispersando y fragmentado** las poblaciones de aves acuáticas por los distintos humedales naturales y artificiales de la cuenca.

Durante el periodo estival, todas las masas de agua censadas han experimentado una bajada moderada del nivel de llenado. En el caso de Alcollarín, se vació como parte de un proyecto de control de la especie exótica invasora *Pseudorasbora parva*, así como Canchales, cuya cota está siendo controlada y limitada a 221 para el correcto control de *Ludwigia grandiflora*.

Tabla 1: Diferencias en el nivel del agua embalsada en las masas de agua censadas para los meses de mayo y junio en 2025 y 2026.

Embalse	2025	2026	Variación
Los Canchales	73,08%	73%	-0,08
El Búrdalo	43,04%	46,84%	-3,8
El Vicario	68,75%	100%	+31,25
Alcollarín	9,62%	42,31%	+32,69
Gargáligas	85,71%	80,95%	-4,76
Gasset	92,31%	89,74%	-2,57
Orellana	87,87%	79,08%	-8,87

Es importante recordar que, al tratarse de un único censo por masa de agua y época del año, los resultados no pretenden ser representativos de los embalses, sino esbozar un **reflejo del estado actual del embalse y la eficacia y funcionalidad de las medidas adoptadas para la avifauna en los mismos**.

Así como en invierno se agregó el embalse de Gargáligas en los censos, en esta campaña estival también se incluyen Gasset y los azudes de Orellana.

3. Resultados de los muestreos realizados

Embalse de los Canchales

El día **29 de mayo de 2026** se lleva a cabo el **censo de aves acuáticas estival** en el embalse de los **Canchales** con los siguientes resultados:

Tabla 2: Especies identificadas y número de ejemplares en el censo estival de Canchales 2026.

ESPECIES	Individuos
Aguilucho Lagunero (<i>Circus aeruginosus</i>)	2
Aguja Colinegra (<i>Limosa limosa</i>)	3
Ánade Friso (<i>Mareca strepera</i>)	7
Ánade Real (<i>Anas platyrhynchos</i>)	87
Archibebe Común (<i>Tringa totanus</i>)	1
Chorlitejo Chico (<i>Charadrius dubius</i>)	7
Chorlitejo Grande (<i>Charadrius hiaticula</i>)	2
Chorlitejo Patinegro (<i>Charadrius alexandrinus</i>)	2
Cigüeña Común (<i>Ciconia ciconia</i>)	15
Cigüeñuela (<i>Himantopus himantopus</i>)	28
Cormorán Grande (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	19
Espátula (<i>Platalea leucorodia</i>)	103
Flamenco Común (<i>Phoenicopterus roseus</i>)	2
Ganso del Nilo (<i>Alopochen aegyptiaca</i>)	57
Garceta Común (<i>Egretta garcetta</i>)	18
Garceta Grande (<i>Ardea alba</i>)	9
Garcilla Bueyera (<i>Bubulcus ibis</i>)	107
Garza Imperial (<i>Ardea purpurea</i>)	6
Garza Real (<i>Ardea cinerea</i>)	17
Gaviota Sombría (<i>Larus fuscus</i>)	1
Martinete (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	2
Morito (<i>Plegadis falcinellus</i>)	9
Pagaza Piconegra (<i>Gelochelidon nilotica</i>)	103
Somormujo Lavanco (<i>Podiceps cristatus</i>)	2
Abundancia	609
Riqueza	24

Tabla 3: Proporción de aves por familia en el censo estival de Canchales 2026.

AVES POR FAMILIA	TOTAL	%	VERANO	%	INVIerno	%
Somormujos y Zampullines	14	1	2	0	12	1
Cormoranes	35	2	19	3	16	2
Garzas, Cigüeñas e Íbises	307	19	288	47	19	2
Anátidas	476	29	151	25	325	32
Rapaces Diurnas	9	1	2	0	7	1
Rascones, Gallinetas y Fochas	154	9	0	0	154	15
Grullas	26	2	0	0	26	3
Limícolas	452	28	43	7	409	40
Charranes	103	6	103	17	0	0
Gaviotas	55	3	1	0	54	5
Total	1631	100	609	100	1022	100




Figura 1: Representación gráfica de proporción de aves por familia en Canchales, verano 2026.

Tras las intensas lluvias y borrascas consecutivas en invierno, el embalse volvió a su cota de llenado del 70%, considerado un umbral seguro para la gestión y control de *Ludwigia grandiflora*.

Este nivel de agua deja islas de vegetación al descubierto, ofreciendo a la comunidad de aves del entorno una diversidad de hábitats donde refugiarse y buscar alimento. A su vez, las amplias orillas tendidas en la zona de cola, favorecidas por el mantenimiento del embalse en una cota de seguridad para los trabajos de control de la *Ludwigia*, forman charcones someros y barrizales ideales para la búsqueda de alimento por parte de la avifauna, especialmente larolimícolas.

Las ardeidas siguen siendo el grupo predominante en las estaciones calurosas, aprovechando las islas de vegetación para formar colonias reproductivas y las orillas con láminas de agua somera para alimentarse.

Cabe destacar la funcionalidad de la isla de la Media Luna, una mancha verde cercana a la cola del embalse, tupida y muy frondosa, que acoge colonias de garcilla bueyera, moritos, garzas reales y un **número muy destacable de espátulas**. En el momento del censo se pudo observar cebas a pollos de espátula y garcilla bueyera, demostrando la **efectividad e idoneidad de esta isla para acoger grupos reproductivos**.

En esta misma isla, se instaló una de las plataformas para águila pescadora donde se ha podido observar, además de la pescadora, a aguiluchos laguneros y gansos del Nilo apostados en la plataforma. En ningún caso se ha constatado actividad reproductiva o presencia de nidos en la estructura, solo como descansadero o en la percha como punto de observación.



Figura 2: Aspecto actual de la cola de Canchales.



Figura 3: Espátula alimentándose en la cola del embalse.

Tras los tratamientos selvícolas de saneamiento realizados en las islas durante el año anterior, **las islas de vegetación** vuelven a ser aprovechadas en Canchales principalmente por ardeidas y colonias de cormorán. Por desgracia, en estas islas también se identifican **gansos del Nilo emparejados y con crías**, ocupando el refugio de otras aves y expulsándolas de las áreas de cría con su comportamiento extremadamente agresivo.

El seguimiento de estas medidas llevadas a cabo por Confederación Hidrográfica del Guadiana para favorecer el asentamiento de la avifauna en el embalse, ha permitido documentar este problema. Se ha observado la ocupación de las cajas nido para tarro blanco, los nidos de ardeidas e incluso la plataforma de águila pescadora, ya sea como lugar de nidificación o simplemente reposo.




Figura 4: Ganso del Nilo.

Respecto a las islas acondicionadas para la reproducción y cría de larolimícolas, **se han identificado decenas de pagazas, especie catalogada como “Sensible a la Alteración de su Hábitat” en el Catálogo Regional de Especies amenazas de Extremadura.** Se localizan apostadas en las islas más someras y sobrevolando el embalse, por lo que es probable que estén siendo utilizadas para su reproducción.



Figura 5: Pagazas apostadas en isla artificial.



Figura 6: Pagaza en el embalse de los Canchales.

Embalse de Alcollarín

El **5 de junio de 2026** se lleva a cabo el **censo de aves acuáticas estivales** en el embalse de **Alcollarín** con los siguientes resultados:

Tabla 4: Especies identificadas y número de ejemplares en el censo estival de Alcollarín 2026.

ESPECIES	Nº Individuos
Aguilucho Lagunero Occidental (<i>Circus aeruginosus</i>)	6
Ánade Real (<i>Anas platyrhynchos</i>)	79
Andarríos Chico (<i>Actitis hypoleucos</i>)	2
Ansar Común (<i>Anser anser</i>)	44

Charrancito (<i>Sterna albifrons</i>)	3
Chorlitejo Chico (<i>Charadrius dubius</i>)	9
Cigüeña Común (<i>Ciconia ciconia</i>)	14
Cigüeñuela (<i>Himantopus himantopus</i>)	3
Cormorán Grande (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	9
Espátula (<i>Platalea leucorodia</i>)	11
Focha Común (<i>Fulica atra</i>)	7
Ganso del Nilo (<i>Alopochen aegyptiaca</i>)	147
Garceta Común (<i>Ardea alba garzetta</i>)	15
Garceta Grande (<i>Egretta alba</i>)	2
Garcilla Bueyera (<i>Bubulcus ibis</i>)	7
Garza Imperial (<i>Ardea purpurea</i>)	3
Garza Real (<i>Ardea cinerea</i>)	9
Gaviota Sombría (<i>Larus fuscus</i>)	1
Martín Pescador (<i>Alcedo atthis</i>)	2
Somormujo Lavanco (<i>Podiceps cristatus</i>)	21
Zampullín Común (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	9
Abundancia	403
Riqueza	21

Tabla 5: Proporción de aves por familia en el censo estival de Alcollarín 2026.

AVES POR FAMILIA	%	VERANO
Somormujos y Zampullines	7	30
Cormoranes	2	9
Garzas, Cigüeñas e Ibises	15	61
Anátidas	67	270
Rapaces Diurnas	1	6
Rascones, Gallinetas y Fochas	2	7
Grullas	0	0
Limícolas	3	14
Charranes	1	3
Gaviotas	0	1
Total	100	401

Debido a la ejecución de trabajos de control y erradicación de la especie exótica invasora *Pseudorasbora parva*, **el embalse fue vaciado prácticamente en su totalidad**. Aun así, se pudo apreciar el potencial para las **poblacionales invernantes de anátidas** en este embalse en censos de años anteriores. En **verano**, las especies de **ardeidas se congregan** formando colonias de nidificación, por lo que es común verlas en mayor número en aguas continentales, aunque **el grupo predominante en estos meses de calor para el embalse de Alcollarín vuelven a ser las anátidas**. **Un resultado representativo del problema que suponen las especies exóticas invasoras** en las dinámicas poblacionales y el aprovechamiento de espacios para las aves, pues **más de la mitad de la abundancia relativa a las anátidas, corresponde al ganso de Nilo**.

A pesar del vaciado casi completo, esta masa de agua continental ha recuperado gran parte de su capacidad a causa de las intensas lluvias de otoño e invierno. Continúa albergando una rica

avifauna que se beneficia del gran reservorio piscícola y el entorno naturalizado que rodea la infraestructura.



Figura 7: Familia de somormujos en el embalse de Alcollarín.

Cabe destacar, con carácter general, la **notable presencia de ánsares en los embalses en esta época**. Esto puede deberse a varios factores: **la presencia de ánsares domésticos asilvestrados sin el instinto de migrar junto a grupos típicamente reproductores de ánsar común** en las vegas del Guadiana y humedales de Castilla. Con carácter general, se observa como cada vez hay más especies que abandonan la migración y se vuelven residentes en la península como resultado del cambio climático y el oportunismo.

Embalse del Vicario

El día **26 de mayo de 2026** se lleva a cabo el **censo de aves acuáticas estivales** en el embalse del **Vicario** con los siguientes resultados:

Tabla 6: Especies identificadas y número de ejemplares en el censo estival del Vicario 2026.

ESPECIES	Individuos
Aguilucho Lagunero (<i>Circus aeruginosus</i>)	3
Ánade Friso (<i>Mareca strepera</i>)	10
Ánade Real (<i>Anas platyrhynchos</i>)	20
Andarríos Chico (<i>Actitis hypoleucos</i>)	1
Ánsar Común (<i>Anser anser</i>)	233
Cigüeña Común (<i>Ciconia ciconia</i>)	5
Cormorán Grande (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	54
Espátula (<i>Platalea leucorodia</i>)	1
Focha Común (<i>Fulica atra</i>)	17
Fumarel Común (<i>Chlidonias niger</i>)	2
Ganso del Nilo (<i>Alopochen aegyptiaca</i>)	2
Garceta Común (<i>Egretta garcetta</i>)	10
Garceta Grande (<i>Ardea alba</i>)	13
Garcilla Bueyera (<i>Bubulcus ibis</i>)	27
Garza Imperial (<i>Ardea purpurea</i>)	13

Garza Real (<i>Ardea cinerea</i>)	22
Gaviota Sombria (<i>Larus fuscus</i>)	10
Martinete (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	14
Morito (<i>Plegadis falcinellus</i>)	46
Polla de agua (<i>Gallinula chloropus</i>)	11
Somormujo Lavanco (<i>Podiceps cristatus</i>)	54
Zampullín Chico (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	1
Abundancia	568
Riqueza	22

Tabla 7: Proporción de aves por familia en el censo estival e invernal del Vicario 2026.

AVES POR FAMILIA	TOTAL	%	VERANO	%	INVIERNO	%
Somormujos y Zampullines	116	12	55	10	61	14
Cormoranes	120	12	54	10	66	15
Garzas, Cigüeñas e Íbises	223	22	151	27	72	17
Anátidas	421	42	265	47	156	36
Rapaces Diurnas	9	1	2	0	7	2
Rascones, Gallinetas y Fochas	71	7	28	5	43	10
Grullas	0	0	0	0	0	0
Limícolas	14	1	1	0	8	2
Charranes	2	0	2	0	0	0
Gaviotas	32	3	10	2	22	5
Total	1008	100	568	100	435	100




Figura 8: Representación gráfica de la proporción de aves por familia en El Vicario, censo de verano 2026.

Al contrario que en el resto de embalses, en el vicario el grupo predominante durante el verano siguen siendo las anátidas. No por una gran riqueza de especies, sino por las centenas de ánsares comunes y domésticos que habitan el embalse desde hace años. Se les ha observado

compartiendo espacio con ánades reales, fochas, y otras especies sin mostrar un comportamiento especialmente agresivo o dominante. Los grupos familiares con polluelos y juveniles se encontraban aislados de las grandes agrupaciones. Destacan unos pocos individuos de ganso del Nilo entre los gansos comunes.

Cerca de la cola de Peralvillo, la gran masa de tarayales semisumergida ha favorecido un ambiente frondoso, aislado y que provee de un magnífico refugio a una gran comunidad de ardeidas: garcillas bueyeras, garzas reales, moritos, etc. Destaca la presencia de una hembra de aguilucho con crías, catalogado como “Vulnerable” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha.



Figura 9: Aguiluchos laguneros en el dique de Peralvillo.

Como viene siendo ya común, el grueso de aves censadas se encuentra en la cola **de Peralvillo**. Su diversidad en hábitats ofrece refugio a las anátidas, que se cobijan en los tarayales y entre el carrizo, al igual que las fochas y ardeidas.

En cuanto a las ardeidas, existe una **gran colonia de varias especies** anidando criando en los tarayales de Peralvillo. Esta colonia está principalmente formada por garcilla bueyera, pero se puede disfrutar de pequeños grupos de espátulas, garza real, moritos e incluso la presencia de varios aguiluchos laguneros, especie que se ha observado criando en este espacio.



Figura 10: Ánsares comunes en el embalse del Vicario.

Los posaderos de Peralvillo siguen ocupados en su mayoría por cormoranes. La gran colonia habitual en el eucalipto del embalse presentaba menos individuos, alrededor de 50. Esto es debido a que, si bien el cormorán es reproductivo a día de hoy en aguas continentales del

interior de la península, históricamente ha sido una especie invernante, por lo que aún hoy algunos individuos realizan desplazamientos a la costa para la cría.



Figura 11: Grupo de cormoranes en un posadero de Peralvillo.

En cuanto a las numerosas **gaviotas** que se contaban en invierno en la tubería del acueducto Tajo-Segura, su número **ha disminuido** considerable (alrededor de un 10%) con la llegada de la época de reproducción, donde muchas de estas aves migran a zonas costeras.



Figura 12: Gaviotas sombrías de diferente edad, a la izquierda la de mayor edad, aun desarrollando plumaje adulto.

Embalse del Búrdalo

El **11 de junio de 2025** se lleva a cabo el **censo de aves acuáticas estivales** en el embalse del **Búrdalo** con los siguientes resultados:

Tabla 8: Especies identificadas y número de ejemplares en el censo estival del Búrdalo 2026.

ESPECIES	Nº de Individuos
Águila Calzada (<i>Hieraaetus pennatus</i>)	1
Aguilucho Lagunero Occidental (<i>Circus aeruginosus</i>)	4
Ánade Friso (<i>Mareca strepera</i>)	26

Ánade Real (<i>Anas platyrhynchos</i>)	143
Ánsar Común (<i>Anser anser</i>)	20
Canastera (<i>Glareola pratincola</i>)	8
Chorlito Chico (<i>Charadrius dubius</i>)	6
Cigüeña Común (<i>Ciconia ciconia</i>)	7
Cormorán Grande (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	193
Espátula (<i>Platalea leucorodia</i>)	33
Ganso del Nilo (<i>Alopochen aegyptiaca</i>)	71
Garceta Común (<i>Egretta garzetta</i>)	44
Garceta Grande (<i>Ardea alba</i>)	16
Garcilla Bueyera (<i>Bubulcus ibis</i>)	51
Garza Imperial (<i>Ardea purpurea</i>)	2
Garza Real (<i>Ardea cinerea</i>)	39
Gaviota Sombría (<i>Larus fuscus</i>)	1
Milano Negro (<i>Milvus migrans</i>)	1
Pagaza Piconegra (<i>Gelochelidon nilotica</i>)	3
Somormujo Lavanco (<i>Podiceps cristatus</i>)	27
Zampullín Común (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	2
Abundancia	698
Riqueza	21

Tabla 9: Proporción de aves por familia en el censo estival del Búrdalo 2026.

AVES POR FAMILIA	VERANO	%
Somormujos y Zampullines	29	4
Cormoranes	193	28
Garzas, Cigüeñas e Ibises	192	28
Anátidas	260	37
Rapaces Diurnas	6	1
Rascones, Gallinetas y Fochas	0	0
Grullas	0	0
Limícolas	14	2
Charranes	3	0
Gaviotas	1	0
Total	698	100

Al igual que en el embalse de Alcollarín, no hay datos invernales para 2026 debido a las intensas lluvias que hicieron imposible acceder al perímetro del embalse de manera segura para realizar el conteo.




Figura 13: Representación gráfica de aves por familias en Alcollarín, censo de verano 2026.

Tras unos años con una gran acogida por parte de variedad de larolimícolas, las islas artificiales para la reproducción de este grupo de aves, se encontraban con poca o ninguna actividad. Estas islas, creadas por Confederación Hidrográfica del Guadiana como refugio y cría, han acogido a pagazas, charrancitos, cigüeñuelas, lavanderas y canasteras en otras ocasiones. Tras una cuidadosa inspección, no se localizan ni polluelos ni puestas, y apenas individuos adultos sobrevolando las islas. Debido a que se les identificó en vuelo desde las islas y, más tarde, nadando en los alrededores, **se sospecha que la presencia de gansos del Nilo con polluelos puede tener peso en este mal resultado.**



Figura 14: Islas artificiales para favorecer la reproducción de larolimícolas en el embalse del Búrdalo.

El **grupo más abundante fueron las anátidas**, seguido de los cormoranes y ardeidas a partes iguales. En general, las agrupaciones no son grandes y las colonias de cormorán parecen estar dispersas hasta en tres núcleos.



Figura 15: Cormoranes grandes en nido.

La presencia de limícolas apenas representa un 2% del total de los grupos identificados en el censo estival, un fuerte contraste frente al verano del 2025, donde alcanzaban el 10% y comportamiento reproductor.



Figura 16: Garcetas y espátulas en un muro derruido del azud de Las Canchalejas.

Embalse del Gasset

El **25 de mayo de 2026** se lleva a cabo el **censo de aves acuáticas estivales** en el embalse del **Gasset** con los siguientes resultados:

Tabla 10: Especies identificadas y número de ejemplares en el censo estival del Gasset 2026.

ESPECIES	Nº Individuos
Ánade Real (<i>Anas platyrhynchos</i>)	23
Ánade Silbón (<i>Mareca penelope</i>)	1
Chorlitejo Chico (<i>Charadrius dubius</i>)	3
Cigüeña Común (<i>Ciconia ciconia</i>)	1
Espátula (<i>Platalea leucorodia</i>)	1
Focha Común (<i>Fulica atra</i>)	5

Fumarel Cariblanco (<i>Chlidonias hybrida</i>)	7
Garceta Común (<i>Egretta garzetta</i>)	6
Garcilla Bueyera (<i>Bubulcus ibis</i>)	16
Garza Imperial (<i>Ardea purpurea</i>)	2
Garza Real (<i>Ardea cinerea</i>)	2
Morito (<i>Plegadis falcinellus</i>)	8
Polla de agua (<i>Gallinula chloropus</i>)	2
Somormujo Lavanco (<i>Podiceps cristatus</i>)	22
Abundancia	99
Riqueza	14

Tabla 11: Proporción de aves por familia en el embalse del Gasset en el censo estival de 2026.

AVES POR FAMILIA	VERANO	%
Somormujos y Zampullines	22	22
Cormoranes	0	0
Garzas, Cigüeñas e Ibises	36	36
Anátidas	24	24
Rapaces Diurnas	0	0
Rascones, Gallinetas y Fochas	7	7
Grullas	0	0
Limícolas	3	3
Charranes	7	7
Gaviotas	0	0
Total	99	100




Figura 17: Representación gráfica de aves por familias en Gasset, censo de verano 2026.

En este embalse se vienen realizando **actuaciones dirigidas a la avifauna y al disfrute recreativo ordenado** del mismo: posaderos, adecuación de orillas, creación de islas artificiales, merenderos, señalización y cartelería, etc.



Figura 18: Vista del embalse de Gasset.

En el momento del censo **las temperaturas eran extremadamente altas y había circulación de camiones y operarios por los caminos perimetrales**, factores que influyen negativamente en el estudio de campo. Aun así, aunque los valores de riqueza y abundancia fueron bajos, se pudo observar la **potencialidad del embalse** para albergar avifauna y otros grupos animales. La vegetación de la orilla no era homogénea, existían zonas arboladas e islas de vegetación, ancones y un entorno tranquilo alejado de perturbaciones.

Hay que tener en cuenta la gran disponibilidad de masas de agua continentales (crecidas de embalses, humedales, charcas temporales, etc.) y la cercanía a otros grandes embalses, como Vicario, que dispersan las comunidades de aves en el territorio, además de los factores mencionados anteriormente.




Figura 19: Islas de reciente creación en la cola de Gasset.

Durante el censo destacó la presencia activa de un **pequeño grupo de fumareles cariblanco**s, especies catalogados como “Vulnerables” por el Catálogo Regional de Castilla la Mancha pescando en el embalse y volando en grupo. En campañas anteriores se pudo observar un grupo similar en el embalse del Vicario, su identificación en el Gasset pone de manifiesto la idoneidad

del entorno como lugar de alimento para la especie. Se espera una evolución favorable en las próximas campañas.

Azudes de Orellana

El **25 de junio de 2026** se lleva a cabo el **censo de aves acuáticas estivales** en el embalse del **Gasset** con los siguientes resultados:

Tabla 12: Especies identificadas y número de ejemplares en el censo estival en los azudes del pantano de Orellana 2026.

ESPECIES	Nº Individuos
Aguilucho Lagunero Occidental (<i>Circus aeruginosus</i>)	4
Ánade Real (<i>Anas platyrhynchos</i>)	69
Ansar Común (<i>Anser anser</i>)	12
Charrancito (<i>Sternula albifrons</i>)	2
Cigüeña Común (<i>Ciconia ciconia</i>)	2
Ganso del Nilo (<i>Alopochen aegyptiaca</i>)	6
Garza Imperial (<i>Ardea purpurea</i>)	6
Garza Real (<i>Ardea cinerea</i>)	2
Gaviota Reidora (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>)	20
Martinete (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	1
Pagaza Piconegra (<i>Gelochelidon nilotica</i>)	2
Somormujo Lavanco (<i>Podiceps cristatus</i>)	7
Abundancia	133
Riqueza	12

Tabla 13: Proporción de aves por familia en los azudes del pantano de Orellana en el censo estival de 2026.

AVES POR FAMILIA	VERANO	%
Somormujos y Zampullines	7	5
Cormoranes	0	0
Garzas, Cigüeñas e Ibises	11	8
Anátidas	87	65
Rapaces Diurnas	4	3
Rascones, Gallinetas y Fochas	0	0
Grullas	0	0
Limícolas	0	0
Charranes	4	3
Gaviotas	20	15
Total	133	100

Proporción de aves por familias en los Azudes del embalse de Orellana





Figura 20: Representación gráfica de aves por familias en los azudes del pantano de Orellana, censo de verano 2026.

Estos tres azudes ubicados en pequeños brazos del embalse, fueron construidos como pequeñas presas de derivación para estabilizar el nivel del agua y proteger estos espacios como humedales del río Guadiana. Están considerados **puntos de interés clave para la observación de las aves** y el ecoturismo de la zona, especialmente para el refugio de anátidas en invierno.

Durante este censo estival, las anátidas han sido el grupo predominante con especies mayoritariamente residentes como el ánser y el ánade real, cuyo número aumenta en invierno al agruparse en grandes números, pero que pueden ser observados en pequeños grupos familiares y machos solitarios en verano.



En general y en mayor o menor medida, las orillas de estos azudes están completamente cubiertas de espadaña y no hay un sistema heterogéneo que brinde refugios a aves de distinta

naturaleza. En el azud de la Bodeguilla, cercano a Puebla de Alcocer, hay un par de islas de vegetación con arbolado de gran porte donde se identificaron garzas imperiales, reales y una veintena de gaviotas reidoras sobrevolando, así como un par de pagazas piconegras.

En el resto de azudes, en el del observatorio y el colindante con la finca “El Sevillano”, predominan las anátidas. Cabe destacar que, en el azud cercano al canal de las Dehesas, donde el observatorio, existe una isla artificial similar a la mostrada en el embalse del Búrdalo. A pesar de estar orientada a larolimícolas, está completamente cubierta de vegetación y apenas conectada con la masa de agua, por lo que se considera totalmente disfuncional.



Figura 21: Islas artificiales en Orellana, sin mantenimiento ni función actual.

Embalse de Gargáligas

El **13 de julio de 2026** se lleva a cabo el **censo de aves acuáticas estivales** en el embalse de **Gargáligas** con los siguientes resultados:

Tabla 14: Especies identificadas y número de ejemplares en el censo estival en el embalse de Gargáligas 2026.

ESPECIES	Nº Individuos
Chorlitejo Chico (<i>Charadrius dubius</i>)	1

Cigüeña Común (<i>Ciconia ciconia</i>)	1
Cormorán Grande (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	3
Ganso del Nilo (<i>Alopochen aegyptiaca</i>)	2
Garceta Común (<i>Egretta garcetta</i>)	1
Garceta Grande (<i>Ardea alba</i>)	7
Garza Imperial (<i>Ardea purpurea</i>)	3
Garza Real (<i>Ardea cinerea</i>)	7
Gaviota Reidora (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>)	6
Martín pescador (<i>Alcedo atthis</i>)	1
Somormujo Lavanco (<i>Podiceps cristatus</i>)	18
Abundancia	50
Riqueza	11

Tabla 15: Proporción de aves por familia en el embalse de Gargáligas en el censo estival e invernal de 2026.

AVES POR FAMILIA	TOTAL	%	VERANO	%	INVIERNO	%
Somormujos y Zampullines	96	3	18	37	78	3
Cormoranes	57	2	3	6	54	2
Garzas, Cigüeñas e Ibises	60	2	19	39	41	1
Anátidas	2741	89	2	4	2739	90
Rapaces Diurnas	4	0	0	0	4	0
Rascones, Gallinetas y Fochas	0	0	0	0	0	0
Grullas	0	0	0	0	0	0
Limícolas	109	4	1	2	108	4
Charranes	0	0	0	0	0	0
Gaviotas	22	1	6	12	16	1
Total	3089	100	49	100	3040	100




Figura 22: Representación gráfica de aves por familias en el embalse de Gargáligas, censo de verano 2026.

Mientras que los resultados para el censo de invierno fueron excepcionales, con más de 3000 aves censadas de 19 especies, la inmensa mayoría anátidas, en esta campaña de verano los resultados son contrarios. Las grandes agrupaciones migran a territorios más frescos y el resto de familias como limícolas, ardeidas o charranes encuentran refugio en otras masas de agua con mayor vegetación, islas artificiales y orillas de aguas someras.

El embalse de Gargáligas, por tanto, **tiene una capacidad e idoneidad excelentes para albergar comunidades de aves en los meses de invierno**, mientras que en verano las especies estivales prefieren otros humedales o masas de agua que le ofrezcan refugio y alimento más adecuados.



Figura 23: Embalse de Gargáligas.

4. Tendencias poblacionales anuales

Se describen a continuación las **tendencias poblacionales de cada uno de los embalses objeto de estudio de los cuales se dispone de una línea temporal suficiente**, en función de los resultados obtenidos durante los últimos censos invernales y estivales realizados.

Embalse de Canchales




Figura 23: Abundancia en Canchales, estival naranja e invernal azul.




Figura 24: Riqueza en Canchales, estival naranja e invernal azul.

Para Canchales, el número de **especies censadas sigue aumentando progresivamente y de manera no lineal**, pues estos números dependen de muchos factores externos que pueden

condicionar la jornada de campo. No ocurre igual con la abundancia invernal, una variable que se ve condicionada en gran medida por los grandes grupos de anátidas y que se muestra muy variable. Los grandes bandos de avefrías y otros grupos monoespecíficos en el momento del estudio de campo, pueden variar estos parámetros.

Para **verano, tanto la riqueza como la abundancia están al alza**. El valor ecológico de este embalse sumado a la cantidad de medidas para promover la diversidad de refugios y lugares de nidificación, hacen de este humedal un auténtico tesoro ornitológico.

Aunque el nivel de agua bajó en 2025 a causa de los trabajos de control y erradicación de *Ludwigia grandiflora*, la correcta gestión de la cota del embalse proporciona un nivel de llenado más de aceptable, favoreciendo la formación de colas de agua someras que benefician a la mayoría de aves. Su completo llenado y vaciado progresivo hasta una cota de gestión segura, ha atraído una riqueza de aves considerable, así como la gran acogida que han tenido las islas de vegetación y aquellas sin plantas destinadas a larolimícolas.

Cabe destacar el descenso en el número de ánades reales en el embalse, una **tendencia observada a nivel mundial** por ser una especie ampliamente distribuida y sensible a la degradación de los humedales y calidad de las aguas.

Como puede apreciarse el proyecto en ejecución de *Adecuación de Islas para la acogida de avifauna en el embalse de los Canchales* no está afectando a la población de aves acuáticas invernantes que suele hacer uso del mismo, mientras que beneficia de manera significativa a las poblaciones estivales.

Embalse de Alcollarín




Figura 25: Abundancia en el embalse de Alcollarín, estival naranja e invernal azul.




Figura 26: Riqueza en el embalse de Alcollarín, estival naranja e invernal azul.

En cuanto a las tendencias que siguen ambas variables, **la abundancia invernal ha disminuido este año considerablemente**, aunque se debe principalmente a que las grandes poblaciones invernantes de anátidas que frecuentan el embalse, se han movilizadas a otras masas de agua por la bajada del nivel del agua.

Esto es debido a las actuaciones proyectadas para el **control de la especie exótica invasora *Pseudorasbora parva***, un pez de pequeño porte que, si bien es excelente como alimento para las comunidades de aves piscícolas, tiene graves impactos en los ecosistemas acuáticos.

En verano la abundancia sigue en descenso, este año de manera más marcada por la disponibilidad de un gran número de humedales y masas de agua, las altas temperaturas y el reflejo de una tendencia negativa mundial en la abundancia de la diversidad.

La riqueza en las jornadas se mantiene positiva y estable, por lo que el embalse de Alcollarín puede considerarse un punto de interés ornitológico, especialmente en invierno en unas condiciones de llenado normales. Tras las borrascas de 2026, el nivel del embalse ha vuelto a estabilizarse, por lo que se espera una acogida por parte de las aves similar a la observada años atrás.

Embalse de El Vicario




Figura 27: Abundancia en el embalse del Vicario, estival naranja e invernal azul.




Figura 28: Riqueza en el embalse del Vicario, estival naranja e invernal azul.

Se trata de un embalse donde existe un **mayor número de individuos en los meses de invierno, aunque esto no conlleva que haya mayor número de especies**. Se puede apreciar como la riqueza en avifauna del embalse se mantiene más o menos estable hasta 2016, donde el número de gaviotas que ocupan las masas de agua dulce en invierno se disparó. En 2022, debido a la bajada del nivel del agua y la creación de largas colas y orillas, la riqueza se disparó, normalizándose poco a poco en los últimos censos con la subida del nivel del agua. En el último año, **ambas variables se estabilizan, con una tendencia positiva poco pronunciada**.

La disponibilidad de otras manchas de agua dulce mejor conservadas por el territorio manchego en los dos últimos años, hace que los grandes grupos de anátidas invernantes se dispersen, una realidad acentuada tras las fuertes borrascas de finales de 2025 y comienzos de 2026, así como el descenso generalizado del número de aves en los humedales españoles.

Embalse del Búrdalo




Figura 29: Abundancia en el embalse del Búrdalo, estival naranja e invernal azul




Figura 30: Riqueza en el embalse del Búrdalo, estival naranja e invernal azul.

Para este embalse de reciente creación, los censos apuntan a que El Búrdalo es una masa de agua con el **potencial para acoger un mayor número de especies e individuos en invierno,**

principalmente anátidas. Por las intensas lluvias mencionadas a lo largo del presente informe, el último censo invernal no se pudo realizar.

Al contrario que en campañas anteriores, donde se pudo confirmar la **eficacia de las islas artificiales de nidificación para larolimícolas**, este año los resultados para estas islas han sido negativos, pudiendo deberse a factores externos como las altas temperaturas, la disponibilidad de otras masas de agua idóneas o la mayor presencia en el entorno de especies muy agresivas como el ganso del Nilo.

Las colonias reproductivas de cormorán siguen activas, con varios pollos por nido y una mayor dispersión de estas agrupaciones en distintos puntos del embalse.

Si bien la abundancia parece disminuir, tal vez por no existir un efecto reclamo ante la disponibilidad de más masas de agua, **el número de especies identificadas año a año, ha aumentado**. En los últimos años se ha disparado la riqueza de especies, siguiendo esta variable una tendencia contundentemente positiva.

5. Conclusiones

Embalse de los Canchales

- La **riqueza** de especies, aunque se ve disminuida levemente en este último año, en el embalse de Los Canchales se sigue una **tendencia positiva**. De esto se deduce que **las medidas para la creación de diferentes tipos de hábitats para la avifauna del embalse parecen cumplir su función**, en especial las islas arboladas donde anidan importantes colonias de ardeidas y sirven de dormitorio durante la invernada tanto a las ardeidas como a los cormoranes.
- Las medidas llevadas a cabo por la CHG para favorecer el asentamiento y reproducción de la avifauna en el embalse han sido un **éxito** para el grupo de los **larolimícolas**, destacando en este último censo **las nuevas islas para larolimícolas, que acogen a decenas de pagazas piconegras**. A su vez, el mantenimiento de una cota de seguridad (221) para el control de la *Ludwigia*, favorece la aparición de colas de aguas someras, atrayentes de estos grupos de aves.
- En el caso de las **plataformas para águila pescadora**, han sido utilizadas por la especie como **posadero** en varias ocasiones.
- Los nidos de ardeidas en la Isla de la Garza, no parecen ocuparse por sus huéspedes objetivo, encontrando este año **la mayoría de las colonias reproductivas de garzas, garcetas, y garcillas en la Isla de la Media Luna**. Destaca el gran número de espátulas y la observación de varias cebas a pollos.

- Se detectan **gansos del Nilo** y parejas ya dispersas **anidando** en la mayoría de las islas del embalse, confirmando un año más su asentamiento en los embalses extremeños. Esta especie **supone una amenaza** sobre el resto de especies nidificantes debido a su elevada territorialidad y agresividad. La especie está ejerciendo **una fuerte presión sobre las especies autóctonas** limitando la eficacia de las actuaciones de mejora de hábitat realizadas, ya que ha ocupado las cajas nido diseñadas para el tarro blanco y las islas recién acondicionadas.
- Este embalse sigue considerándose un **punto de interés ornitológico** en la cuenca del Guadiana gracias a la gran riqueza de especies acuáticas invernantes que acoge, así como otras especies emblemáticas del embalse como el elanio común o el águila pescadora.
- Los trabajos de control y erradicación de *Ludwigia grandiflora* **no parecen perjudicar a la avifauna** del embalse. La bajada de la cota a un nivel de seguridad para su gestión ha atraído a cantidad de especies que aprovechan estas orillas para alimentarse, especialmente larolimícolas.
- Se espera que el proyecto en marcha “*Adecuación de islas para acogida de avifauna en el embalse de los Canchales*” **aumente y mejore, aún más si cabe, la capacidad de acogida del embalse** y favoreciendo el asentamiento de especies amenazadas como las pagazas y las espátulas

Embalse de Alcollarín

- Tras un proceso de **vaciado completo** por la ejecución de medidas para el control de la especie exótica invasora *Pseudorasbora parva*, el embalse ha recuperado su nivel de llenado. Se esperan valores de riqueza y abundancia estables para el próximo año.
- En condiciones normales, es considerado un **punto de interés ornitológico** durante todo el año, alcanzando su **máximo potencial en los meses de invierno** ofreciendo una bella variedad de aves en gran abundancia y fácilmente avistables.
- Se sigue detectando un número elevado de **gansos del Nilo** en el embalse, especie catalogada como exótica invasora.

Embalse del Vicario

- El Vicario es considerado otro **gran punto de interés ornitológico** donde disfrutar de una gran riqueza de anátidas, donde se pueden observar especies poco frecuentes como el pato colorado, el porrón europeo y el tarro blanco.
- El llenado de otros embalses cercanos y la disponibilidad de masas de agua continentales tras las fuertes lluvias, hacen que Peralvillo no actúe de reclamo y zona de concentración para las aves como sí ocurría en años anteriores.

- En los últimos años, se observa como **la colonia reproductiva de ardeidas gana abundancia y riqueza** en las islas artificiales de Peralvillo creadas por Confederación Hidrográfica del Guadiana, **otorgando una heterogeneidad al paisaje que beneficia a toda la diversidad que alberga el embalse.**
- **Destaca la presencia continuada de un grupo de fumareles cariblancos y, este año común, en la zona.** Ambas especies son “Vulnerables” según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla La Mancha.
- Se recomienda la retirada de basura acumuladas en el embalse, ya sea por la gran cantidad de pescadores que visitan la zona o por la gran cantidad de personas que visitan dicho embalse.

Embalse del Búrdalo

- Si bien este embalse no destaca por su abundancia, la riqueza va tomando una tendencia **claramente positiva.**
- Se constata la importancia de esta masa de agua **como otro lugar de cría de larolimícolas y cormoranes,** aunque factores externos como el clima y la presencia de exóticas invasoras pueden perturbar el funcionamiento de las islas artificiales que tan buena acogida tenían hasta ahora.

Embalse de Gasset

- Aunque durante la jornada las altas temperaturas y la presencia de operarios trabajando en el perímetro del embalse pudieron influir en los valores de riqueza y abundancia obtenidos, el embalse **tiene potencial para albergar avifauna y convertirse en un lugar interesante para la observación y conservación de estos animales.**

Azudes de Orellana

- Si bien su construcción contempló la conservación de las aves, a día de hoy su relevancia para las aves típicamente estivales es menor. Se esperan resultados de riqueza y abundancia mayores en invierno, **dada su idoneidad para agrupar anátidas.**
- La isla artificial para larolimícolas en el Azud cercano a la finca “El Sevillano” está desconectada de la masa de agua y sin mantenimiento. **Con carácter general se recomienda la adecuación de estos espacios,** así como de las infraestructuras que las mantiene, con el fin de conservar estos rincones húmedos con el potencial para albergar especies invernales de gran interés.

Embalse de Gargáligas

- Mientras que **en invierno demostró ser un embalse de gran valor para las grandes agrupaciones de anátidas y grullas**, la falta de heterogeneidad y refugio en sus orillas, mayormente descubiertas, hacen que las especies típicamente estivales prefieran otras masas de agua disponibles en el territorio.

En Mérida a 20 de agosto de 2026

LA GRADUADA EN CIENCIAS AMBIENTALES



Carmen Hernández Ruíz

LA LICENCIADA EN BIOLOGÍA



María del Carmen Molina Moya

VºBº COMISARIO DE AGUAS ADJUNTO

Nicolás Cifuentes y de la Cerra

CIFUENTE
S DE LA
CERRA
NICOLAS -
50823172
A

Firmado digitalmente por CIFUENTES DE LA CERRA NICOLAS - 50823172A
Fecha: 2026.08.31 08:40:40 +02'00'